PrEP injectable en PACA : chez les femmes, une première PrEP plus souvent qu'un relais

DEP10

Guillaume GRAS[1], Adeline MORISOT[2], Roxane CATANEO-BERTRAND[1], Ciprian ION[3], Moussa FOFANA[4], Erika KURZAWA[5], Paul Enguerran SEISSON[6], Marie GARNOTEL[7], Isabelle COPIN-PAGES[7], Isabelle MARGALEJO[3], Corinne MONNIER[8], Mattéo VASSALLO[9], Viviana BERGAMASCHI[10], Pervenche MARTINET[11], Pascal PUGLIESE[2], Marie-Sophie ANTOLINI-BOUVENOT[2]

[1] CeGIDD Marseille CD13 · [2] CoReSS PACA · [3] CeGIDD Nice CD06 · [4] CSMSS CeGIDD Spot Longchamp Marseille, AIDES · [5] CeGIDD CH Martigues · [6] CeGIDD CH Avignon · [7] CeGIDD 83 · [8] CeGIDD Aix-en-Provence CD13 · [9] CeGIDD CH Cannes · [10] CeGIDD Manosque CD04 · [11] Service Prévention Santé CD13

Introduction

- Cabotégravir injectable remboursé en France depuis mars 2026
- Les CeGIDD suivent une part importante des personnes sous PrEP, où les femmes sont très minoritaires
- **Objectifs :** mesurer le recours à la PrEP injectable, distinguer primo-prescriptions et relais d'une PrEP orale, décrire les motifs de relais et comparer la modalité d'instauration selon le sexe

Méthodes

- Période : 1er janvier – 31 août 2026
- 2 méthodes d'évaluation
  - Recueil déclaratif sur trame commune auprès des 9 CeGIDD de la région PACA + files actives PrEP : extraction régionale du logiciel métier, complétée auprès des 2 centres qui ne l'utilisent pas
  - exploitation du SNDS tous prescripteurs
    - Exclusion des personnes sous traitement antirétroviral (PVVIH, VOCABRIA)
    - Primo-initiation définie par aucune délivrance de PrEP depuis 2016
- Intervalles de confiance à 95 % : méthode de Wilson

Résultats : PrEP injectable dans le SNDS

170
usagers de la PrEP injectable
2,3 % des usagers de la PrEP
dont 135 Bouches-du-Rhône (77 %)

7 275
usagers de la PrEP

Usager.e.s ayant retiré la PrEP injectable en pharmacie, par mois (2026)



Résultats : PrEP injectable dans les CeGIDD PACA

8 CeGIDD sur 9 ont répondu

153
usagers de la PrEP injectable
3,5 % des usagers de la PrEP
0 à 11,1 % selon les centres

4 397
usagers de la PrEP

Injections réalisées au CeGIDD dans 79,1 % des cas

L'instauration de PrEP injectable se fait à **près de 80 %** en relais de la PrEP orale (122 / 153)

Motifs de relais PrEP orale vers PrEP injectable



Plusieurs motifs possibles par personne

A. Primo-initiations parmi les usagers de PrEP injectable, selon le sexe



B. Part de femmes selon le type de PrEP



Barres d'erreur : intervalles de confiance à 95 % (méthode de Wilson)

Conclusion

Le recours à l'injectable reste limité et inégalement réparti (0 à 11 % des usagers de la PrEP selon les centres) ; c'est d'abord un relais de la PrEP orale, principalement pour intolérance ou difficulté d'observance

Chez les femmes, l'initiation à la PrEP paraît se faire, sur de faibles effectifs, plus souvent par la PrEP injectable. La PrEP injectable pourrait toucher un public que la PrEP orale atteint peu (à confirmer sur de plus grands effectifs)

Le SNDS et le recueil des données CeGIDD à l'échelle de la région PACA sont concordants et complémentaires

CeGIDD : centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic · SNDS : Système national des données de santé · Contact : guillaume.gras@departement13.fr